

Frauenherzen


Arlesheim Fortbildung 2025

PD Dr. Dr. Fabian Nietlispach

Interessenskonflikte

- Berater Abbott und Edwards Lifesciences

Kardiologie: Spektrum







Aortenklappe

- Aufgabe: abdichten


Der häufigste Klappenfehler: Aortenstenose





Aortenstenose

- Folge: Blut staut zurück
- „Wasser auf der Lunge“
- Atemnot



Schwere Aortenstenose

- Behandlung:

Klappe ersetzen

Aufschneiden

mit Katheter

WELCHE METHODE IST BESSER BEI FRAUEN?

48 KLINIKEN - 443 PATIENTEN - 12 LÄNDER



	Surv	P-Value
Death		0.44
Cardiac death		1.00
Non-cardiac death		0.36
Stroke		1.00
Disabling stroke		0.68
Non-disabling stroke		0.72
Rehospitalization		0.02
valve-related rehospitalization		
procedure-related rehospitalization		
worsening congestive heart failure		


**MEHR
HOSPITALISATIONEN
NACH DER OPERATION**

WAS IST DER PREIS

	TAVI - Surgery	P-Value
Major vascular comp	2%, 5.3%]	0.07
Life-threatening	3.7]	1.00
Life-threatening	6]	0.11
Myocardial inf	6]	0.24
Acute kidney	6]	0.17
New permanent	6]	0.01
New onset	9%]	<0.001
NYHA Class II/	1%]	0.20
5m walk test (se	0.82]	0.38
KCCQ-OS score cha	7, 5.7]	0.13
Valve Reintervention	6 [-0.4, 1.4%]	0.50
Valve thrombosis	0.5% [-0.4%, 1.4%]	1.00
Valve dysfunction	0.5% [-0.4%, 1.4%]	1.00

**WENIGER
SCHRITTMACHER
NACH DER OPERATION**

UNTERSCHIED ZU STUDIE MIT MEHRHEITLICH MÄNNERN?





Konklusion

- Es gibt Daten zu Frauen mit Aortenstenose
- Die Daten nach 1 Jahr sind in den Grundsätzen gleich wie bei Männern
 - Trotz anderer Anatomie
 - Trotz anderer Risikofaktorverteilung

hz.
herzzentrum
im park

HIRSLANDEN 
KLINIK IM PARK

Danke